

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Marburg  
Direktor: Prof. A. Schwenkenbecher.

---

# Der Einfluß von Adrenalin, Pilocarpin und Atropin auf das weiße Blutbild des Menschen.

---

## Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

der

Hohen Medizinischen Fakultät der Universität Marburg

vorgelegt von

**K. Th. Kraft**

aus Oberschönau.

Marburg 1930

---

Buchdruckerei von Joh. Hamel

Angenommen von der medizinischen Fakultät Marburg  
am 22. Juli 1930.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät.

Referent: Prof. Dr. Schwenkenbecher.



Die Frage nach den Einflüssen des vegetativen Nervensystems auf die Art des weißen Blutbildes ist nach den grundlegenden Untersuchungen von Bertelli, Falta und Schweeger wiederholt tierexperimentell und in Versuchen an Menschen behandelt worden. Man hoffte durch Veränderung des Vagus- bzw. des Sympathicustonus ein Blutbild zu erzeugen, das einen Anhaltspunkt für die Regulation des Blutes durch das autonome Nervensystem geben sollte.

Einerseits strebte man durch Pharmaka, deren Wirkung vorzüglich auf das autonome Nervensystem gerichtet ist, wie Adrenalin, Pilocarpin und Atropin einen Einfluß auf die Funktion des haematopoetischen Apparates auszuüben (Bertelli, Falta, Schweeger) (4). Andererseits suchte man durch elektrische oder mechanische Reizung der freigelegten Nerven das Blutbild zu ändern. (Skorczewski und Wasserberg (37), Hajos (16).

Methodisch scheint die direkte mechanische Reizung der Nerven die Frage nach der nervösen Regulation des Blutes eindeutiger zu beantworten, ist jedoch aus begreiflichen Gründen nur am Tier zur Anwendung gelangt. Die Reizung mit pharmakologischen Mitteln ist insofern für die Fragestellung schwierig, als die Möglichkeit der sekundären Wirkungen dieser Mittel, die viele Angriffspunkte im Körper haben, nicht ausgeschlossen werden kann.

Auf Grund der bei diesen Versuchen gewonnenen Ergebnisse stellte eine Reihe von Autoren, die eine gesetzmäßige Veränderung gefunden zu haben glaubte, den Begriff eines sympathischen und parasympathischen Blutbildes auf. (Bertelli, Falta, Schweeger (4), Hoff (19, 20, 21), Hajos (16, 17) u. A. Niedrige oder normale Leucocytenzahl sowie Hypereosinophilie sollten ein Ueberwiegen des „Parasympathicus“ kennzeichnen, während Leu-

cöcytose mit Vermehrung der Lymphocyten und Hypereosinophilie als Characteristicum des „sympathischen“ Blutbildes beschrieben wird. Ein Parallelismus zwischen einer Erhöhung des Vagustonus und einer Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blut fanden Hajos (16, 17) und Mitarbeiter im Tierexperiment, sowie bei klinischer Beobachtung von Asthmatikern.

Demgegenüber fehlt es nicht an Stimmen, die nach pharmakologischer Reizung des Nervensystems eine gleichmäßige Veränderung des weißen Blutbildes nicht feststellen konnten (Schwab 43, 44), Wollenberg (47, 48), Kägi (23) u. a.). Auch speziell auf die Beeinflussung der Eosinophilen gerichtete Untersuchungen konnten nicht durchweg ein gesetzmäßiges Verhalten dieser Zellformen aufdecken. (Aschenheim (1), Brackmann (5), Herick (18) u. a.).

Es steht also in der Literatur Behauptung gegen Behauptung, deren jede sich trotz ziemlich einheitlicher Grundlage der angewandten Versuchstechnik auf recht unterschiedliches Material stützt. Als einzig eindeutiges Ergebnis wird die nach Adrenalin auftretende Vermehrung der Gesamtleukozytenzahl durchgehend beschrieben. Kägi und Wollenberg führen die Widersprüche zahlreicher Beobachtungen darauf zurück, daß Ergebnisse von Tierversuchen mit Untersuchungen am Menschen als gleichwertig beurteilt werden, obwohl die Reaktionen bei Tier und Mensch und sogar der einzelnen Menschen untereinander sehr verschieden sind. Eine Reihe unserer Arbeiten fügt dem bisher erörterten Problem noch die Frage nach der Bedeutung des „aktuellen“, besonders des „konstitutionell“ gegebenen Tonus im vegetativen Nervensystem hinzu. (Schenk (34a), Walterhöfer (45, 46), T. Bruhn (7). Frühere Untersuchungen der Klinik hatten gezeigt, daß weder bei klinisch ausgesprochen vagotonisch eingestellten Patienten (Bruhn), noch nach Umstimmung des vegetativen Nervensystems durch Aenderung des Säure-Basen-Gleichgewichtes (Boeminghaus (8) eine Eosinophile gesetzmäßig auftritt.

Es sollte daher untersucht werden, ob sich ein pharma-

kologisch gereiztes autonomes Nervensystem anders verhält als ein konstitutionell bzw. ein auf andere Weise in seinem Tonus beeinflusstes System. Wir haben zu diesen Untersuchungen einmal Personen herangezogen, die klinisch einen normalen Befund und keinen abnormen Tonus des vegetativen Systems boten. Zum anderen untersuchten wir Patienten mit einer Eosinophilie, da uns das eosinophile Blutbild im Zusammenhang mit diesen autonomotropen Mitteln besonders interessierte, darunter auch Leute mit Asthma bronchiale, bei denen eine Labilität des vegetativen Systems bekanntlich vorherrscht.

### Versuchstechnik.

Die Wirkung von Adrenalin, Pilocarpin und Atropin auf die Gesamtleukozyten und das weiße Blutbild wurde an 8 Versuchspersonen in folgender Weise geprüft:

Nach Anfertigung eines Blutbildes erhielt jeder Patient morgens nüchtern an 3 verschiedenen aufeinanderfolgenden Tagen eine subkutane Injektion von 1 mg Adrenalin bzw. 10 mg Pilocarpin oder 1 mg Atropin. Etwa 5 bis 10 Minuten später kamen unter anderem, Herzklopfen, Speichelfluß, Schweißausbruch zur Beobachtung, woraus auf eine sichere pharmakologisch wirksame Dosierung zu schließen war. Die Zählung der Leukozyten wurde in der Thoma-Zeiß'schen Zählkammer ausgeführt, die Trockenpräparate mit May-Grünwaldfärbung vorbereitet und mit Giemsa nachgefärbt. Aus jedem Trockenpräparat wurden aus verschiedenen Stellen 500 Zellen ausdifferenziert. — Die sich bei den Zählungen ergebenden Veränderungen der Gesamtleukozyten sowie des Differentialblutbildes bedürfen einer Prüfung auf ihre sachliche Verwertbarkeit. Auch bei bester Technik ist keine Untersuchungsmethode so vollkommen, daß sie absolut richtige Werte liefert. Jede Einzelbestimmung ist bald zu hoch, bald zu niedrig im Vergleich zu dem Idealwert. Da es sich bei diesen instrumentellen Fehlern meist um kleinere Abweichungen handelt, sieht man mit Recht geringere Differenzen als unzuverlässig an. Nun muß aber

die Grenze gezogen werden zwischen realen Werten und solchen, die noch im Bereich der Fehlergrenzen liegen.

Nach der Fehlerlehre kommt das arithmetische Mittel einer Anzahl von Bestimmungen der Wahrheit am nächsten. Das Mittel weicht im Durchschnitt um einen mehr oder minder großen Betrag von den „richtigen“ Werten ab. Diese Abweichung wird als „mittlerer Fehler“ bezeichnet. Wie die Fehlertheorie zeigt, werden Einzelergebnisse mit geringer Abweichung vom arithmetischen Mittel häufiger, solche mit erheblicher Differenz selten beobachtet. Man hat sich gewöhnt solche Differenzen, die das 2 bis 3 fache des mittleren Fehlers überschreiten, als sachlich verschieden anzusehen. Die Fehlertheorie ergibt nämlich, daß unter einer Reihe von Einzelbestimmungen derselben Größe praktisch kein Ergebnis vorkommt, das jenen Rahmen überschreitet. Durch die Errechnung des „mittleren Fehlers“ ist uns die Möglichkeit geboten, eine Differenz auf ihre Verwertbarkeit zu prüfen. Die Wichtigkeit der Fehlerrechnung zur Vermeidung von Fehlschlüssen hat Pütter (30) neuerdings betont und eine praktische Anleitung angegeben. Brandt (6) hat bereits früher die Wichtigkeit der Fehlerrechnung für haematologische Arbeiten betont, da hier trotz scheinbar exakter Methode große Fehlermöglichkeiten vorliegen. In Anlehnung an die genannten Autoren wurde der mittlere Fehler nach der bekannten Formel errechnet:

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{\sum Dx^2}{n-1}}$$

In dieser Formel bedeutet:  $\sum Dx^2$  = die Summe der Quadrate aller Differenzen der betreffenden Einzelbestimmungen gegen das gefundene arithmetische Mittel und „n“ die Anzahl der jeweilig ausgeführten Bestimmungen.

Für die Leukozytenzählung beläuft sich „der mittlere Fehler“ auf etwa 6 bis 8%. Wir können aber erst Differenzen von 30% als verwertbar ansehen. Dieser Prozentsatz entspricht etwa dem 2 fachen mittleren Fehler, der fast alle möglichen Abweichungen praktisch in sich schließt.

Auch für die prozentualen Angaben des Differentialblutbildes insbesondere der Eosinophilen wurde der mitt-

lere Fehler nach obiger Formel errechnet. Dabei zeigte sich deutlich der Einfluß der mehr oder minder gleichmäßigen Verteilung der Zellen im Ausstrichpräparat auf die Genauigkeit des Resultates. Selbstverständlich ist die mehr oder minder große Genauigkeit eines so erzielten Ergebnisses nicht ohne Einfluß auf die sachliche Verwertbarkeit einer Differenz zweier Untersuchungsreihen. Mit zunehmender Genauigkeit der verglichenen Resultate wächst die Bedeutung kleinerer Differenzen.

Ein mathematischer Ausdruck dieser Ueberlegung ist folgende Formel, die fraglichen Differenzen ihren mittleren Fehlern gegenüberstellt in Form des Quotienten „K“.

$$K = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}$$

Hierin bedeutet  $M_1 - M_2$  die strittige Differenz vom Anfangswert gemessen,  $\mu_1$  u.  $\mu_2$  sind die „mittleren Fehler“ der Untersuchungsergebnisse der beiden zu vergleichenden Reihen, deren sachliche Verschiedenheit zur Diskussion steht. Erst eine Differenz, die außerhalb der Fehlergrenzen liegt, ist sachlich verwertbar. In solchem Falle nimmt „K“ einen Wert von 2 und darüber an. (vgl. Pütter).

Es folgt nun an einem Beispiel die Errechnung nach den oben besprochenen Formeln, die einen Anhaltspunkt für die zu beurteilenden Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungsreihen geben sollen.

### Beurteilung der Gesamtleukozytendifferenzen.

I. (Anfangswert)

II. (2. Versuchsreihe)

Zahl der Leukozyten pro Zählkammer (mit 200 zu multiplizieren)

|           | Dx    | Dx <sup>2</sup>                |
|-----------|-------|--------------------------------|
| 33        | + 1,7 | 2,89                           |
| 30        | — 1,3 | 1,69                           |
| 31        | — 0,3 | 0,9                            |
| <u>94</u> |       | <u>5,48 = Σ Dx<sup>2</sup></u> |

Arithmetisches Mittel  $M_1 = 31,3$

Anzahl der Bestimmungen  $n = 3$

$$\mu_1 = \sqrt{\frac{\Sigma Dx^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{5,48}{2}}$$

$$= \pm 1,65 = 5,3\% \text{ des Mittelwertes}$$

|            | Dx  | Dx <sup>2</sup>              |
|------------|-----|------------------------------|
| 35         | — 1 | 1                            |
| 34         | — 2 | 4                            |
| 39         | + 3 | 9                            |
| <u>108</u> |     | <u>14 = Σ Dx<sup>2</sup></u> |

$M^2 = 36,0$

$n = 3$

$$\mu_2 = \sqrt{\frac{\Sigma Dx^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{14}{2}}$$

$$= \pm 2,64 = 7,3\% \text{ vom Mittelwert}$$

$$K = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}} = \frac{31,3 - 36}{\sqrt{2,74 + 7}} = \frac{4,7}{\sqrt{9,74}} = 1,5$$

$K = 1,5$  (Mithin keine verwertbare Differenz der beiden verglichenen Untersuchungsreihen).

### Abgekürzte Auswertung (n. Brandt):

Leukozyten I = 6260

„ II = 7200

Differenz = 940 = 14% des Mittelwertes,

Mittelwert = 6730

Mithin keine sachliche Verschiedenheit der beiden Resultate.

### Berechnung des Differentialblutbildes:

Prozentsatz der Neutrophilen. (500 Zellen ausdifferenziert).

| I. (Anfangswert)                                                  |       |                       | II. (2. Versuchsreihe)                                 |     |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| %                                                                 | Dx    | Dx <sup>2</sup>       | %                                                      | Dx  | Dx <sup>2</sup>    |
| 68                                                                | + 2,2 | 4,84                  | 67                                                     | — 1 | 1                  |
| 68                                                                | + 2,2 | 4,84                  | 66                                                     | — 2 | 4                  |
| 61                                                                | — 4,8 | 22,0                  | 66                                                     | — 2 | 4                  |
| 66                                                                | + 0,2 | 0,4                   | 74                                                     | + 6 | 36                 |
| 66                                                                | + 0,2 | 0,2                   | 67                                                     | — 1 | 1                  |
| 329                                                               |       | 32,48 = $\Sigma Dx^2$ | 340                                                    |     | 46 = $\Sigma Dx^2$ |
| $M_1 = 65,8_{\%}; n = 5;$                                         |       |                       | $M_2 = 68_{\%}; n = 5;$                                |     |                    |
| $\mu_1 = \sqrt{\frac{\Sigma Dx^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{32,48}{4}}$ |       |                       | $\mu_2 = \sqrt{\frac{46}{4}} = \sqrt{11,5} \quad 3,38$ |     |                    |
| $= \sqrt{8,12} = 2,85$                                            |       |                       |                                                        |     |                    |

$$K = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}} = \frac{65,8 - 68}{\sqrt{8,12 + 11,5}} = \frac{2,2}{\sqrt{19,62}} = \frac{2,2}{4,4} = 0,5$$

K = 0,5 (Mithin keine verwertbare Differenz der beiden verglichenen Untersuchungsreihen).

Prozentsatz der Lymphozyten.

| I. (Anfangswert)                                   |       |                      | II. (2. Versuchsreihe)                                |       |                      |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| %                                                  | Dx    | Dx <sup>2</sup>      | %                                                     | Dx    | Dx <sup>2</sup>      |
| 22                                                 | — 0,2 | 0,8                  | 24                                                    | + 0,2 | 0,4                  |
| 26                                                 | + 1,4 | 1,96                 | 23                                                    | — 0,8 | 0,64                 |
| 23                                                 | — 1,6 | 2,62                 | 24                                                    | + 0,2 | 0,4                  |
| 29                                                 | + 4,4 | 19,4                 | 25                                                    | + 1,2 | 1,44                 |
| 23                                                 | — 1,6 | 2,62                 | 23                                                    | — 0,8 | 0,64                 |
| 123                                                |       | 33,6 = $\Sigma Dx^2$ | 119                                                   |       | 3,52 = $\Sigma Dx^2$ |
| $M_1 = 24,6_{\%}; n = 5;$                          |       |                      | $M_2 = 23,8_{\%}; n = 5;$                             |       |                      |
| $\mu_1 = \sqrt{\frac{33,6}{4}} = \sqrt{8,4} = 2,9$ |       |                      | $\mu_2 = \sqrt{\frac{3,52}{4}} = \sqrt{0,88} = 0,936$ |       |                      |

$$K = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}} = \frac{24,6 - 23,8}{\sqrt{8,4 + 0,88}} = \frac{0,8}{\sqrt{9,28}} = \frac{0,8}{3,05} = 0,262$$

K = 0,262 (Mithin keine verwertbare Differenz der beiden verglichenen Untersuchungsreihen).

# Prozentsatz der eosinophilen Zellen.

| I. (Anfangswert)                                                  |       |                       | II. (2. Versuchsreihe)                            |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| ‰                                                                 | Dx    | Dx <sup>2</sup>       | ‰                                                 | Dx    | Dx <sup>2</sup>     |
| 4                                                                 | — 2,4 | 5,8                   | 6                                                 | — 0,8 | 0,64                |
| 8                                                                 | + 2,6 | 6,8                   | 6                                                 | — 0,8 | 0,64                |
| 7                                                                 | + 0,6 | 0,36                  | 8                                                 | + 1,2 | 1,44                |
| 7                                                                 | + 0,6 | 0,36                  | 8                                                 | + 1,2 | 1,44                |
| 6                                                                 | — 0,4 | 0,16                  | 6                                                 | — 0,8 | 0,64                |
| 32                                                                |       | 13,48 = $\Sigma Dx^2$ | 34                                                |       | 4,8 = $\Sigma Dx^2$ |
| $M_1 = 6,4 \text{ ‰}; n = 5;$                                     |       |                       | $M_2 = 6,4 \text{ ‰}; n = 5;$                     |       |                     |
| $\mu_1 = \sqrt{\frac{\Sigma Dx^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{13,48}{4}}$ |       |                       | $\mu_2 = \sqrt{\frac{4,8}{4}} = \sqrt{1,2} = 1,1$ |       |                     |
| $= \sqrt{3,38} = 1,84$                                            |       |                       |                                                   |       |                     |

$$K = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}} = \frac{6,4 - 6,8}{\sqrt{3,38 + 1,1}} = \frac{0,4}{\sqrt{4,48}} = \frac{0,4}{2,11} = 0,19$$

$K = 0,19$  (Mithin keine verwertbare Differenz der beiden verglichenen Untersuchungsreihen).

So betrachtet lassen sich die Ergebnisse der Versuchsreihen mit Adrenalin, Pilocarpin und Atropin folgendermaßen zusammenfassen.

Adrenalin. (Tabelle I). s. S. 12.

Nach Adrenalin zeigt die Gesamtleukozytenzahl einheitlich einen deutlichen Anstieg. Die eosinophilen Zellen sind in einer Reihe von Fällen merklich vermindert, in anderen liegen die Ergebnisse innerhalb der Fehlergrenzen. Die prozentualen Neutrophilenwerte zeigen bei der Mehrzahl der untersuchten Patienten eine Neigung zum Abfall, die in 2 Fällen (4. u. 7.) recht deutlich zu Tage tritt.

Die Lymphozyten fanden wir in den meisten Fällen mehr oder minder stark vermehrt. Durch mehrfache Vornahme von Untersuchungen innerhalb einer Stunde nach der Injektion dürften unsere Daten mit der Adrenalinwirkung

in Zusammenhang gebracht werden. (vgl. Bemerkung von Kägi). Uebereinstimmend mit den Angaben der Literatur ist also eine Vermehrung der Gesamtleukozytenzahl feststellbar. Das Verhalten der einzelnen Zellformen muß im ganzen als uncharakteristisch bezeichnet werden. Den gleichen Eindruck gewinnt man auch bei der Zusammenstellung der verschiedenen einander bald bestätigenden, bald widersprechenden Angaben der oben zitierten Autoren.

Personen mit Eosinophilie und Asthma bronchiale zeigten dabei kein wesentlich abweichendes Verhalten im Vergleich mit den normalen.

Pilokarpin. (Tabelle II). s. S. 13.

Die nach subkutaner Injektion von Pilokarpin ausgeführten Leukozytenzählungen ergaben teils Zunahme, teils Abnahme der weißen Blutzellen. Ein ebenso wechselndes Bild bot das Verhalten der einzelnen Zellformen. So konnte auch trotz sicher wirkender Dosis ein einheitlicher, deutlicher Einfluß des Pilokarpins auf die eosinophilen Zellen nicht beobachtet werden.

Bei der Durchsicht der zahlreichen, einander widersprechenden Angaben der Autoren über den Einfluß des Pilokarpins gewinnt man ebenso wie aus unseren Versuchen die Anschauung, daß es keine gesetzmäßige Wirkung dieses Mittels auf das morphologische Blutbild gibt, mag es sich um Normalpersonen oder um Patienten mit Asthma bronchiale bzw. Eosinophilie handeln.

Atropin. (Tabelle III). s. S. 14.

Ein gleichartiges Verhalten der Leukozytenzahl nach subkutaner Atropininjektion haben wir nicht beobachtet. 2 Fälle (Nr. 2 und 4) wiesen einen beträchtlichen Abfall der weißen Blutkörperchen auf. Bei keiner der verschiedenen Zellformen, weder den Neutrophilen, noch Lymphozyten oder Eosinophilen ließ sich ein gesetzmäßiges Verhalten nachweisen. Bei Fall Nr. 3 und 6 zeigen die Eosinophilen eine Abnahme, die jedoch nicht sicher außerhalb der Fehlergrenzen liegt.

Weder bei unseren normalen Versuchspersonen, noch bei Patienten mit Vermehrung der eosinophilen Zellen vor

Adrenalin  
0.001

Tabelle I

| Nr.                                   | Zeit        | Gesamt-<br>Leukoz. | Neutrophile |        | Lymphozyten |        | Eosinophile |        | Bem. |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------|
|                                       |             |                    | ‰           | absol. | ‰           | absol. | ‰           | absol. |      |
| 1.) Sch.<br>gesund                    | Vorher      | 6400               | 64          | 4096   | 30          | 1920   | 4           | 256    |      |
|                                       | Nach 5 Min. | 7200               | 60          | 4320   | 33          | 2376   | 4,6         | 331    |      |
|                                       | " 15 "      | 9000               | 56          | 5040   | 39          | 3510   | 3,0         | 270    |      |
|                                       | " 60 "      | 7300               | 60          | 4380   | 35          | 2555   | 3,4         | 248    |      |
| 2.) Th.<br>gesund                     | "           | 6600               | 45          | 2970   | 48          | 3168   | 3,6         | 238    |      |
|                                       | "           | 9000               | 47          | 4270   | 48          | 4320   | 2,0         | 180    |      |
|                                       | "           | 11500              | 40          | 4600   | 54          | 6210   | 3,1         | 356    |      |
|                                       | "           | 6800               | 48          | 3264   | 46          | 3128   | 3,0         | 204    |      |
| 3.) H.<br>gesund                      | "           | 11500              | 60          | 6900   | 35          | 4025   | 1,8         | 207    |      |
|                                       | "           | 15500              | 55          | 8525   | 42          | 6510   | 1,0         | 155    |      |
|                                       | "           | 12500              | 60          | 7500   | 37          | 4625   | 0,8         | 100    |      |
|                                       | "           | 12000              | 58          | 6960   | 39          | 4680   | 1,2         | 144    |      |
| 4.) Sch.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale | "           | 14600              | 65          | 9290   | 20          | 2920   | 12,7        | 1854   |      |
|                                       | "           | 17800              | 64          | 11392  | 22          | 3916   | 12,4        | 2207   |      |
|                                       | "           | 19000              | 61          | 11590  | 24          | 4560   | 11,2        | 2128   |      |
|                                       | "           | 17000              | 58          | 9860   | 32          | 5440   | 7,2         | 1224   |      |
| 5.) E.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale   | "           | 12000              | 72          | 8640   | 18          | 2160   | 6,2         | 754    |      |
|                                       | "           | 13000              | 70          | 9100   | 20,8        | 2704   | 7,0         | 910    |      |
|                                       | "           | 14400              | 69          | 9936   | 21          | 3024   | 6,2         | 893    |      |
|                                       | "           | 12400              | 73          | 9052   | 18          | 2232   | 5,8         | 719    |      |
| 6.) W.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 9000               | 55          | 4950   | 27          | 2430   | 13          | 1170   |      |
|                                       | "           | 12800              | 65          | 7168   | 28          | 3584   | 11          | 1405   |      |
|                                       | "           | 13800              | 55          | 7590   | 31          | 4278   | 10          | 1380   |      |
|                                       | "           | 16000              | 58          | 9280   | 24          | 3840   | 14          | 2240   |      |
| 7.) G.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 8400               | 62          | 5208   | 30          | 2520   | 5,4         | 453    |      |
|                                       | "           | 8000               | 58          | 4640   | 32          | 2560   | 6,6         | 528    |      |
|                                       | "           | 11500              | 56          | 6440   | 36          | 4140   | 5,0         | 575    |      |
|                                       | "           | 9000               | 60          | 5400   | 30          | 2700   | 7,4         | 666    |      |
| 8.) M.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 4200               | 51          | 2142   | 40          | 1680   | 6,0         | 252    |      |
|                                       | "           | 4600               | 45          | 2070   | 47          | 2162   | 5,0         | 230    |      |
|                                       | "           | 6000               | 44          | 2640   | 48          | 2880   | 5,0         | 300    |      |
|                                       | "           | 5500               | 50          | 2750   | 47          | 2585   | 2,0         | 110    |      |

Pilokarpin  
0,01

Tabelle II

| Nr. II                                | Zeit        | Gesamt-<br>Leukoz | Neutrophile |        | Lymphozyten |        | Eosinophile |        | Bem. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------|
|                                       |             |                   | %           | absol. | %           | absol. | %           | absol. |      |
| 1.) Sch.<br>gesund                    | Vorher      | 6400              | 64          | 4096   | 30          | 1 920  | 4           | 256    |      |
|                                       | Nach 5 Min. | 5900              | 62          | 3658   | 33          | 1 947  | 3,8         | 224    |      |
|                                       | „ 15 „      | 6300              | 61          | 3843   | 33          | 2 079  | 3,4         | 214    |      |
|                                       | „ 60 „      | 7300              | 62,2        | 4541   | 33          | 2 409  | 3,8         | 277    |      |
| 2.) Th.<br>gesund                     | „           | 6000              | 50          | 3000   | 43          | 2 580  | 4           | 240    |      |
|                                       | „           | 6800              | 49          | 3332   | 45          | 3 060  | 3,4         | 231    |      |
|                                       | „           | 7800              | 51          | 3978   | 44          | 3 432  | 3,2         | 250    |      |
|                                       | „           | 7200              | 60          | 4320   | 34          | 2 448  | 2,6         | 187    |      |
| 3.) H.<br>gesund                      | „           | 11000             | 52          | 5720   | 44          | 4 840  | 2,8         | 308    |      |
|                                       | „           | 9400              | 50          | 4700   | 55          | 4 230  | 3,4         | 320    |      |
|                                       | „           | 8400              | 55          | 4600   | 39          | 3 276  | 3,0         | 252    |      |
|                                       | „           | 8900              | 48          | 4272   | 48          | 4 272  | 2,6         | 231    |      |
| 4.) Sch.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale | „           | 14400             | 50          | 7200   | 27          | 3 888  | 21          | 3024   |      |
|                                       | „           | 15000             | 52          | 7800   | 25          | 3 750  | 21          | 3150   |      |
|                                       | „           | 14700             | 52          | 7644   | 24          | 3 528  | 21,8        | 3205   |      |
|                                       | „           | 14600             | 50          | 7300   | 27          | 3 942  | 21          | 3066   |      |
| 5.) E.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale   | „           | 10000             | 66          | 6600   | 24          | 2 400  | 6,4         | 650    |      |
|                                       | „           | 11200             | 68          | 7056   | 27          | 3 024  | 7,6         | 851    |      |
|                                       | „           | 12000             | 68          | 8160   | 22          | 2 640  | 6,8         | 816    |      |
|                                       | „           | 9200              | 66          | 6072   | 22          | 2 024  | 8,8         | 810    |      |
| 6.) W.<br>Eosino-<br>philie           | „           | 7600              | 57          | 4332   | 26          | 1 976  | 15          | 1140   |      |
|                                       | „           | 9000              | 58          | 5200   | 24          | 2 160  | 14,8        | 1332   |      |
|                                       | „           | 13700             | 60          | 8220   | 21          | 2 877  | 15          | 2055   |      |
|                                       | „           | 8000              | 59          | 4720   | 23          | 1 840  | 14          | 1120   |      |
| 7.) G.<br>Eosino-<br>philie           | „           | 8900              | 58          | 5162   | 33          | 2 937  | 5,8         | 516    |      |
|                                       | „           | 6000              | 58          | 3480   | 34          | 2 040  | 4,8         | 288    |      |
|                                       | „           | 7600              | 55          | 4180   | 37          | 2 812  | 5,8         | 441    |      |
|                                       | „           | 8200              | 55          | 4510   | 37          | 3 034  | 5,0         | 410    |      |
| 8.) M.<br>Eosino-<br>philie           | „           | 5400              | 43          | 2322   | 42          | 2 268  | 12,4        | 670    |      |
|                                       | „           | 5100              | 45          | 2295   | 44          | 2 244  | 9,4         | 480    |      |
|                                       | „           | 5400              | 45          | 2430   | 45          | 2 430  | 9,0         | 486    |      |
|                                       | „           | 4600              | 43          | 1987   | 43,6        | 2 006  | 9,8         | 451    |      |

| Atropin<br>0,001                      |             | Tabelle III        |             |        |             |        |             |        |      |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------|
| Nr.                                   | Zeit        | Gesamt-<br>Leukoz. | Neutrophile |        | Lymphozyten |        | Eosinophile |        | Bem. |
|                                       |             |                    | %           | absol. | %           | absol. | %           | absol. |      |
| 1.) Sch.<br>gesund                    | Vorher      | 6800               | 65          | 4420   | 31          | 2108   | 3,0         | 204    |      |
|                                       | Nach 5 Min. | 6000               | 59          | 3540   | 36,6        | 2196   | 3,4         | 204    |      |
|                                       | " 15 "      | 5600               | 59          | 3304   | 37          | 2072   | 3,2         | 179    |      |
|                                       | " 60 "      | 6600               | 60          | 3960   | 35,5        | 2343   | 4,0         | 264    |      |
| 2.) Th.<br>gesund                     | "           | 8500               | 57          | 4845   | 35,8        | 2043   | 5,0         | 425    |      |
|                                       |             | 7200               | 52          | 3744   | 39,6        | 2851   | 5,4         | 389    |      |
|                                       |             | 6000               | 57          | 3420   | 35,0        | 2100   | 5,6         | 336    |      |
|                                       |             | 7800               | 54          | 4212   | 39          | 3042   | 4,8         | 374    |      |
| 3.) H.<br>gesund                      | "           | 15000              | 62          | 9300   | 34          | 5100   | 2,6         | 390    |      |
|                                       |             | 15300              | 57          | 8721   | 37          | 5661   | 2,0         | 306    |      |
|                                       |             | 13000              | 58          | 7540   | 38          | 4940   | 1,6         | 208    |      |
|                                       |             | 12000              | 69          | 8280   | 28          | 3360   | 0,8         | 96     |      |
| 4.) Sch.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale | "           | 12000              | 55          | 6600   | 25          | 3000   | 18,0        | 2160   |      |
|                                       |             | 13000              | 58          | 7540   | 23          | 2990   | 16,6        | 2158   |      |
|                                       |             | 8000               | 53          | 4240   | 24          | 1920   | 19,0        | 1580   |      |
|                                       |             | 12000              | 52          | 6240   | 25          | 3000   | 19,0        | 2280   |      |
| 5.) E.<br>Asthma<br>bron-<br>chiale   | "           | 10400              | 65          | 6700   | 24          | 2496   | 9,6         | 998    |      |
|                                       |             | 10600              | 67          | 7102   | 22,4        | 2375   | 8,0         | 848    |      |
|                                       |             | 9600               | 63          | 6048   | 24          | 2304   | 9,8         | 941    |      |
|                                       |             | 10800              | 64          | 6912   | 25          | 2700   | 9,0         | 972    |      |
| 6.) W.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 9000               | 55          | 4950   | 29          | 2610   | 12          | 1080   |      |
|                                       |             | 10000              | 55          | 5500   | 28          | 2800   | 13          | 1300   |      |
|                                       |             | 11000              | 54          | 5940   | 30          | 3300   | 10,6        | 1166   |      |
|                                       |             | 8000               | 47          | 3760   | 41          | 3280   | 8,0         | 640    |      |
| 7.) G.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 10200              | 58          | 5916   | 26          | 2652   | 11,8        | 1204   |      |
|                                       |             | 10600              | 54          | 5724   | 32          | 3392   | 9,4         | 996    |      |
|                                       |             | 9000               | 57          | 5130   | 29          | 2610   | 10,8        | 972    |      |
|                                       |             | 8000               | 59          | 4720   | 26,4        | 2112   | 10,4        | 832    |      |
| 8.) M.<br>Eosino-<br>philie           | "           | 4400               | 46          | 2024   | 43          | 1892   | 7,5         | 330    |      |
|                                       |             | 4100               | 46          | 1886   | 42          | 1722   | 10,0        | 410    |      |
|                                       |             | 4000               | 48          | 1920   | 43          | 1720   | 7,0         | 280    |      |
|                                       |             | 4600               | 52          | 2392   | 37          | 1702   | 10,0        | 460    |      |

Ausführung der Untersuchung fanden wir eine charakteristische Wirkung des Atropins.

Wir schließen uns daher der Ansicht an, wie sie vielfach in der Literatur geäußert ist, daß eine einheitliche Atropinwirkung auf das Blutbild fehlt.

Unsere vorstehenden Ergebnisse decken sich also mit den Resultaten derjenigen Autoren, die keinen eindeutigen Einfluß durch die pharmakologische Reizung des vegetativen Nervensystems auf die Gestaltung des weißen Blutbildes beobachten konnten. Schwankungen in der quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Leucocytenwerte konnten wir nach allen drei pharmakologischen Reizmitteln sehen. Jedoch entbehren die Veränderungen nach Atropin und Pilocarpin eines gleichsinnigen Verhaltens und liegen meistens noch im Bereich der physiologischen Schwankungen der Leucocytenzahl. — Dagegen veranlaßt uns die von uns und in der Literatur durchgehend beobachtete Adrenalinleucocytose im Folgenden kurz die Einflüsse zu erörtern, die als Ursache für die Veränderung des weißen Blutbildes im Sinne einer Leucocytose verantwortlich zu machen sind.

Adrenalin wirkt als sympathikotropes Mittel auf den Gefäßtonus, und verschiedene Autoren wie Kaegi, Walterhöfer und E. F. Müller u. A. geben eine Bestätigung dafür, daß ein zahlenmäßiger Einfluß durch die Gefäßinnervation auf die Menge der weißen Blutkörperchen vorliegt. So sieht Kaegi (23) die Vermehrung der Leucocyten nach Adrenalin als Verteilungsleucocytose an, die infolge der durch Adrenalin ausgelösten veränderten Strömungsbedingungen innerhalb der Gefäße eintritt. Nachdem Versuche von Schwenkenbecher und Siegel (34a) zu dem Resultat geführt haben, daß die Verteilung der Leucocyten in den verschiedenen Gefäßbezirken des normalen Tierorganismus im allgemeinen eine recht gleichmäßige ist, konnten andere Autoren nach Reizung des zugehörigen Nervensystems Verteilungsdifferenzen zwischen peripheren und zentralen Gefäßgebieten beobachten. Wie Filinski (12) mitteilt, soll nach Vagusreizung sich eine Anhäufung der Leucocyten in

inneren Organen und eine Verminderung in den äußeren Gefäßgebieten einstellen, während Sympathicusreizung umgekehrte Effekte im Gefolge haben. Durch Untersuchungen von E. F. Müller (25, 26) ist ebenfalls ein antagonistisches Verhalten zwischen Splanchnikusgebiet und peripherem Hautgefäßgebiet wahrscheinlich gemacht worden. Auf diese Grundlage gestützt ließe sich die Zunahme der Leucocyten durch den Reiz des sympathikotrop wirkenden Adrenalins erklären.

Walterhöfer (45) macht für die schwankenden Leucocytenzahlen „nach Reizen überhaupt“ eine Summe von Einzelvorgängen verantwortlich, unter denen die durch Erregung der Vasomotoren ausgelöste wechselnde Füllung der Gefäßgebiete und Konzentrationsveränderung infolge einer durch Tonusschwankung hervorgerufenen Durchlässigkeitsänderung der Gefäßwände die wichtigsten sind.“ In das Kapitel der Verteilungsleucocytose rechnet Bürker (8a) z. B. alle physiologischen Leucocytosen, die nur als Scheinleucocytosen betrachtet werden, weil das Vorkommen der jugendlichen Formen der Leucocyten nicht nachgewiesen werden kann. Er nimmt auch an, „daß das vegetative Nervensystem auf die Gefäßendothelien oder Hormondrüsen einwirkend, Blutreize schafft, die die blutbildenden Organe beeinflussen“ und es fehlt nicht an Stimmen in der Literatur, die Neubildung der weißen Zellen nach Adrenalin für erwiesen halten wie z. B. Hoff, Stockinger, Borchardt, Walterhöfer, Wollenberg u. A.

Ein direkter Einfluß auf das weiße Blutbild kann u. E. nur an dessen Bildungsstätte angreifen, da die Zellen des strömenden Blutes nervös nicht erfaßt werden können. Als Vermittler des auf die Zellbildungsstätten ausgeübten Reizes sieht Hoff (19—22) die reichliche Versorgung des haematopoetischen Apparates mit Nervenfasern an. Walterhöfer (45) weist im Tierversuch nach, daß die Adrenalinleucocytose nicht auf einer sogenannten scheinbaren Leucocytose beruht, sondern daß es sich um eine wirkliche Zellvermehrung im Blute nach Adrenalininjektion handelt. Er sagt, „daß durch das Adrenalin ein Reiz auf die Blutbildungsstätten ausgeübt wird und zwar auf das Knochenmark ebenso wie auf das lymphatische System. Durch diesen Reiz werden

die im haematopoetischen Apparat in Reservedepots liegenden Zellen in vermehrter Anzahl herausbefördert. Infolge der Geringfügigkeit des Reizes reicht der Zellvorrat an reifen Zellen in Depots aus, um den Bedarf zu decken. Deswegen kommt es bei der Adrenalinleucocytose auch lediglich zur Ausschwemmung der reifen blutfähigen Zellen.“

Ein indirekter Reiz wäre auf die Tätigkeit der endokrinen Drüsen zurückzuführen, die durch Aenderung im Tonus des vegetativen Nervensystems reguliert werden. Es würde also auf hormonalem Wege von den innersekretorischen Drüsen aus das weiße Blutbild geändert werden. (Stockinger, Borchardt, Schenk, Bürker). Daß in der Tat Neubildung von Zellen in den Blutbildungsstätten nach Adrenalin stattfindet, hat Stockinger (39—42) in schönen Untersuchungen mit Hilfe der Oxydasereaktion gezeigt. In der Arneeth'schen Kernverschiebung, d. h. in dem Auftreten wenig segmentierter Zellformen sieht auch Wollenberg (47, 48) einen Beweis für vermehrte Zellenneubildung unter dem Einfluß von Adrenalin. Die Leucocytenzahl selbst scheint auch zentral-nervöser Regulierung unterworfen zu sein, wie Untersuchungen von Hoff und Linhardt (22), Rosenow (33) und Borchardt (3) gezeigt haben.

Daß aber die Ansicht von Bertelli, Falta und Schweeger u. A. von einem rein sympathisch oder parasympathisch bedingten Blutbilde auf pharmakologische Reize nicht erwiesen ist, da sich dabei verschiedene Wirkungen der pharmakologischen Reizstoffe des autonomen Nervensystems überdecken, in dem auch unerwünschte Reize auf die Drüsen mit innerer Sekretion einwirken, zeigt Borchardt (3) in eingehenden Versuchen. Er kommt an Hand seiner Untersuchungen zu dem Resultat, daß Adrenalin scheinbar auf dem Umwege über Hormone bzw. das autonome Nervensystem zur Leucocytose führt. — Mit der Einwirkung so verschiedener Faktoren auf die Gestaltung des weißen Blutbildes entfällt daher die Möglichkeit, den Beweis für die alleinig regulierende Funktion des autonomen Nervensystems zu erbringen. Vielmehr ist dieses eingeschaltet in ein System zentraler und peripherer Regulationen zur Anpassung des Blutbildes an die jeweiligen Ansprüche.

## Literaturverzeichnis.

1. Aschenheim u. Pomonow: Monatssch. f. Kinderhke 10.
2. Arneth: Monographie Klinghardt 1920.
3. Borchardt: Archiv f. exp. Path. u. Pharmak. 139, 1929.  
" Archiv f. exp. Path. u. Pharmak. 137, 1928.
4. Bertelli, Faltau, Schweeger: Zeitschr. f. Kl. Med. 71, 1910.
5. Brackmann u. M.: Fol. Häm. Zentralorgan 34, S. 57.
6. Brandt: Fol. Häm. Archiv 1926, Bd. 32.
7. Bruhn: Inaug. Diss. Marburg 1929.
8. M. Boeminghaus: Inaug. Diss. Marburg 1930.
- 8a. Bürker: Hdb. d. norm. u. path. Physiol. Bethe-Bergm, Bd. VI. 1928.
9. Eppinger u. Heß: Zeitschr. f. Kl. Med. 67, 68. 1910.
10. Frey: Zeitschr. f. exp. Med. 2 u. 3, 1914.
11. Földes u. Schermann: Zeitschr. f. Kl. Med. 107, 1928.
12. Filinski: Kongreß 1925, Bd. 39, S. 513.
13. Gaisböck: Zit. v. Kägi.
14. Gehrig: Zeitschr. f. exp. Path. u. Therap. 17, 1915.
15. Goldscheider u. Jakob: Zeitschr. f. kl. Med. 25, 1894.
16. Hajos u. M.: Zeitschr. f. d. g. exp. Med. 45, 1925 S. 503.
17. Hajos u. Enyedy: Ref. Kongreß Zentralbl. Bd. 51, S. 40.
18. Herrik: Zit. v. Nägeli.
19. Hoff: D. M. W. 1928 Nr. 22, S. 905.
20. " Ergebnisse d. i. Med. u. Khd. 33. 1928 u. 13, 1929.
21. " Monographie Springer 1930.
22. Hoff-Lienhardt: Zeitschr. f. exp. Med. 63, 1928.
23. A. Kägi: Fol. Häm. Archiv 25, 1920.
24. M. Löwenstein: Zeitschr. f. exp. Path. u. Therap. 17.
25. E. F. Müller: M. M. W. 1924, S. 202.
26. " Kl. Wo. 1926, S. 137.
27. L. R. Müller: Die Lebensnerven, Springer 1924.
28. Nägeli: Blutkrankheiten u. Blutdiagnostik.
29. Neuhser: Wiener Kl. Wo. 1892, 3 u. 4.
30. Pütter: Monographie, Walter de Gryter, Berlin-Leipzig 1929.
31. Poll: Klin. Wo. 1928, S. 1777.
32. Port u. Brunow: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1914, S. 76.
33. Rosenow: Verhdlg. d. deutsch. G. f. i. Med. 40. Kong. 1928.
34. Schenk: D. M. W. 1920, S. 1192.
- 34a. Schwenkenbecher u. Siegel: D. Arch. f. kl. Med. 92, 1908.
35. Schwenker u. Schlecht: Zeitschr. f. kl. Med. 67, 1912.
- 35a. Schilling: Hdb. d. norm. u. path. Physiol. Bethe-Bergm.  
Bd. VI, 28.
36. Spitthoff: Fol. Häm. Arch. 32, 1926.

- 36 a. Seyderhelm: Hdb. d. norm. u. path. Physiol. Bethe-Bergm.  
6. 1928.
37. Skorczewski u. Wasserberg: Zeitschr. f. exp. Path. u.  
Therap. 10, 1912.
38. Stäubli: Ergebnisse d. Khkd. u. i. Med. 6, 1910.
39. Stockinger: Zeitschr. f. exp. Med. 58 1928, S. 757.
40. " " " " " 65 1928, S. 614
41. " " " " " 65 1929, S. 52.
42. " " " " " 70 1930, S. 599.
43. Schwab: Zeitschr. f. exp. Med. 62 1929, S. 30.
44. " " " " " 63 1928, S. 177.
45. Walterhöfer: D. Arch. f. kl. Med. 135, 1921.
46. " " " " " 153, 1926.
47. Wollenberg: Zeitschr. f. kl. Med. 91, 1921.
48. " " " " " 92. 1921.
49. Wollheim; Zeitschr. f. exp. Med. 52 u. 53.
50. " Kli. Wo. 41, 1925.
-

## Lebenslauf.

---

Am 9. 8. 1904 wurde ich als Sohn des Pfarrers *Ludwig Kraft* und seiner Ehefrau *Minna* geb. *Reuter* in Oberschönau Krs. Schmalkalden geboren, bin preußischer Staatsangehörigkeit, evangelischer Konfession. Ich besuchte die Volksschule zu Amönau Krs. Marburg bis 1915 und 9 Jahre lang anschließend das humanistische Gymnasium zu Marburg, das ich im Februar 1924 mit dem Zeugnis der Reife verließ. In Marburg studierte ich Medizin und legte im Oktober 1926 die klinische Vorprüfung ab. Im Sommersemester 1927 studierte ich in Greifswald und im Wintersemester 1927/28 in München, die beiden letzten Semester wieder in Marburg, wo ich am 24. Juni 1929 mein medizinisches Staatsexamen beendete.

Meine medizinischen Lehrer waren :

In Marburg : v. *Auwers*, *Bonhoff*, *Burkhardt*, *Claußen*, *Dittler*, *Eimer*, *Freudenberg*, *Göppert*, *Grüter*, *Gürber*, *Hildebrand*, *Kehrer*, *Klapp*, *Korschelt*, *Kutscher*, *Kretschmer*, *Läwen*, *Maus*, *Moog*, *Ed. Müller*, † *Naujoks*, *Nauck*, *Ruete*, *Schäfer*, *Schubert*, *Schwenkenbecher*, *Uffenorde*, *Versé*, *Wiedhopf*.

In Greifswald : *Degkwitz*, *Höhne*, *Pels-Leusden*, *Schönfeld*.

In München : *Borst*, *Döderlein*, *Fr. v. Müller*, *v. Pfaundler*, *Straub*, *Sauerbruch*, *v. Zumbusch*.

Ihnen allen bin ich zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

---

Zum Schlusse meiner Ausführungen möge es mir gestattet sein, Herrn Professor *Schwenkenbecher* für die freundliche Ueberlassung des Themas sowie Herrn Dr. *Peipers* für das gütige Interesse, das sie dem Zustandekommen meiner Arbeit entgegenbrachten, zu danken.